

INDICACIONES

LÁSER CO2 - COOL PEEL

PREVIO AL TRATAMIENTO

7 días antes

- Suspender retinoides y activos potencialmente irritantes: retinol/tretinoína, ácido glicólico, ácido azelaico, ácido tranexámico y otros ácidos indicados por el profesional.
- Evitar exfoliantes físicos o mecánicos.
- Informar si se encuentra utilizando corticoides, antibióticos, isotretinoína u otros medicamentos, para evaluar si requieren suspensión y por cuánto tiempo.

Herpes



- Si tiene antecedentes de herpes labial o facial, debe informarlo previamente. En caso de ser necesario, se indicará profilaxis antiviral de manera individual.
- No se debe realizar el procedimiento si existe herpes activo. Se podrá reagendar una vez completada la recuperación y con la piel completamente íntegra.

POST TRATAMIENTO

Primeras 24 horas

- No lavar el rostro.
- No aplicar productos sobre la piel, salvo aquellos específicamente indicados por su profesional.
- suspender maquillaje y la rutina habitual de skincare durante 7 días.
- Evitar completamente la exposición solar. Utilizar barrera física: sombrero, jockey, anteojos y permanecer a la sombra.
- Tomar Vitamina C 1 g: 1 comprimido cada 12 horas durante 7 días, salvo contraindicación médica individual.

Desde las 24 horas – Días 1 a 3

- Aplicar Cicaplast 3 veces al día.
- Utilizar protector solar y reaplicar cada 4 horas.
- Mantener protección física frente al sol.

* Desde el segundo día, realizar higiene muy suave, sin frotar la piel. Puede utilizar agua termal para refrescar y humectar la zona a modo de spray .

Desde el día 3

- * Reemplazar Cicaplast por la crema de exosomas indicada.
- * Continuar con fotoprotección estricta.
 - * No retirar costras, descamaciones ni frotar la piel.

Desde el día 10

- * Retomar progresivamente la rutina de skincare, priorizando productos suaves, reparadores e hidratantes.
- * En la noche, incorporar Anti-Pigment Dual Serum de Eucerin, siempre que la piel se encuentre recuperada y sin irritación.

Hasta el día 15, evitar:

- * Retinoides.
- * Ácidos exfoliantes.
- * Ácido glicólico y azelaico.
- * Ácido tranexámico y otros activos potencialmente irritantes.
- * Exfoliantes físicos o mecánicos.

Desde el día 15

- * Si la piel está completamente recuperada, retomar progresivamente la rutina habitual de skincare.
- * Evitar la exposición solar directa durante al menos 2 a 4 semanas y mantener fotoprotección rigurosa.

IMPORTANTE

Ante dolor intenso o creciente, secreción, ampollas, heridas, inflamación importante, fiebre, aparición de lesiones compatibles con herpes o cualquier evolución que genere preocupación, comuníquese con nosotros para evaluación.